

รายการยาที่ต้องป้องกันแสง

รายการยา		รูปแบบ
ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	
Allopurinol	Puride <sup>®</sup>	Tablet
Alprazolam		Tablet
Aminophylline		Injection
Tetanus immunoglobulin		Injection
Ascorbic acid (Vitamin C)		Tablet
Atenolol	Tenormin <sup>®</sup>	Tablet
BCG vaccine		Injection
Ceftriaxone	Rocephin <sup>®</sup>	Injection
Chlorpheniramine		Injection,Syrup
Chlpromazine		Tablet,Injection,Syrup
Colchicine		Tablet,Injection
Cotrimoxazole		Tablet,Syrup
Dexamethazone		Injection
Diazepam		Tablet,Injection
Digoxin	Lanoxin <sup>®</sup>	Tablet,Elixir,Injection
Dopamine hydrochloride		Injection
Doxycycline hydrochloride	Doxyclyne <sup>®</sup>	Capsule,Injection
Enalapril	Anapril <sup>®</sup>	Tablet
Ethambutol hydrochloride		Tablet
Fluphenazine decanoate	Fendac <sup>®</sup>	Injection
Furosemide	Lasix <sup>®</sup>	Tablet,Injection
Haloperidol decanoate	Haldol <sup>®</sup>	Injection
Hydrochlorothiazide (HCTZ)		Tablet
Hydrogen peroxide		Solution
Hydroxyzine		Tablet,Syrup
Isosorbide dinitrate	Isordil <sup>®</sup>	Sublingual tablet, Tablet
Ketamine hydrochloride	Ketalar <sup>®</sup>	Injection
Ketoconazole	Nizoral <sup>®</sup>	Tablet,Cream
Measles vaccine		Injection
Measles + Mumps + Rubella virus		Injection
Vaccine live		
Metformin hydrochloride	Glucophage <sup>®</sup>	Tablet

รายการยาที่ต้องป้องกันแสง

รายการยา		รูปแบบ
ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	
Methylergometrine maleate	Metergin <sup>®</sup>	Injection
Metoclopramide		Injection
Metronidazole	Flagyl <sup>®</sup>	Tablet,Injection
Morphine sulfate		Injection
Multivitamin		Tablet,Syrup
Naloxone hydrochloride		Injection
Nifedipine		Capsule,CR tablet
Omeprazole		Capsule,tablet
Perphenazine		Tablet
Pethidine hydrochloride		Injection
Phenobarbital		Injection
Phenytoin	Dilantin <sup>®</sup>	Capsule, Injection
Potassium chloride		Tablet
Prazosin	Pratsiol <sup>®</sup>	Tablet
Propranolol hydrochloride		
Rabies Vaccine		Injection
Ranitidine hydrochloride	Xanidine <sup>®</sup>	Tablet,Injection
Rubella vaccine	Rudivax <sup>®</sup>	Tablet
Salbutamol	Ventolin <sup>®</sup>	Injection,Syrup, Respiratory solution
Simvastatin	Zimmex <sup>®</sup>	Tablet
Terbutaline	Bricanyl <sup>®</sup>	Injection
Tetanus immunoglobulin	Tetuman Berna <sup>®</sup>	Injection
Tetracaine hydrochloride		Eye Drop
Thyroxine sodium	Eltroxin <sup>®</sup>	Tablet
Trimethoprim		Tablet
Trimethoprim sulfate + Polymyxin B sulfate	Primoptic <sup>®</sup>	Eye Drop
Tripolidine hydrochloride + Pseudoephedrine hydrochloride	Actifed <sup>®</sup>	Tablet,syrup
Verapamil hydrochloride	Isoptin <sup>®</sup>	Tablet,Injection
Vitamin A		Tablet

รายการยาที่ต้องป้องกันแสง

รายการยา		รูปแบบ
ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	
Vitamin B complex		Tablet,Injection
Vitamin B1 (Thiamine -mononitrate)		Tablet,Injection
Vitamin B <sub>1-6-12</sub>		Tablet
Vitamin B2 (Riboflavin)		Tablet
Vitamin C (Ascorbic acid)		Tablet,Injection,Syrup
Vitamin E		Capsule
Zidovudine	Retrovir®	Tablet

ความคงตัวของยาฉีด

ชื่อการค้า/ ชื่อสามัญ	วิธีฉีด	Recommended Solution For IV infusion	ความคงตัว ในตู้เย็นเมื่อผสม /เปิดแล้ว	ความคงตัวที่ R.T. เมื่อผสม/เปิดแล้ว	หมายเหตุ
Adrenaline	IM,SC,IV infusion	D5S,NSS,LRS	24 hrs.	24 hrs.	ไม่เข้ากันกับ Sodium bicarbon,Aminophylline เข้ากันกับ Dopamine,Dobutamine, Diltiazem
Aminophylline inj.	IV	D5W	24 hrs.	NA	การให้ยา โดยหยดช้าๆ ด้วยอัตราเร็ว < 20 mg/min
Ampicillin inj.	IV	NSS ( IV infusion ) SWI (IV bolus)	4 hrs.	1 hrs.	-
Atropine inj.	SC,IM, <u>IV</u> <u>infusion</u> , IVbolus	SWI , NSS	-	15 minute	-
Calcium gluconate inj.	IV infusion, IVbolus	D5W,NSS	-	24 hr.	ห้ามผสมกับ Na bicarbonate, carbonate,phosphate,sulfate, tartrates
Ceftriaxone	IV:10 ml 2-4 min IV infusion:40 ml 5-15 min IM	NSS,W,D5W	24 hr.	6 hr.	เข้ากันกับ Amompg;ucoside,Calcium gluconate
Cloxacillin	Show IV over 3-4 min 500 mg ทุก 4-6 ชม.	Water for inj.	72 hr.	24 hr.	แนะนำให้ใช้ทันทีเมื่อผสมเสร็จ ใหม่ ๆ ไม่เข้ากันกับ Bloodproduct, Proteinfluid,Amoniglycosides, Tetracycline,Erythromycin, polycmycin
Chlopheniramine inj.	SC,IM,IVbolus	-	-	-	-

ชื่อการค้า/ ชื่อสามัญ	วิธีฉีด	Recommended Solution For IV infusion	ความคงตัว ในตู้เย็นเมื่อผสม /เปิดแล้ว	ความคงตัวที่ R.T. เมื่อผสม/เปิดแล้ว	หมายเหตุ
Dexamethasone (Na phosphate)	SC,IM,IV	D5W minimum volume 50 ml	2 day	24 hr.	-
Diazepam inj.	IM,Slow IV	D5W,LRS	-	-	ไม่ควรใช้ NSS (ทำให้เกิดตะกอน)
Diclofenac inj.	IM,IV infusion	-	-	-	-
Digoxin inj.	IV infusion, IVbolus	D5W(50 ml for infusion) SWI(>4-fold vol.)	48 hr. if conc.= 2.5 mg/L.	-	-
Dopamine 250mg/10 ml.	IV infusion	D5W,NSS	-	24 hr.in D5W, 48 hr.in NSS.	ยาไม่เข้ากับสารละลาย ประเภทด่าง (alkaline solution เช่น bicarbonate)
Fluphenazine inj.	IM	-	-	-	-
Gentamicin inj.	IV infusion (*avoid direct IV)	D5W (≤ 150 mg/50 ml.) NSS (>150 mg/100 ml)	-	24 hrs.	-
Haloperidol inj.	IM	-	-	-	-
Lasix inj. (Furosemide)	IM, IV : 1-2 นาที IV infusion : max rate 10 mg/ml	D5W,NSS,LRS	-	24 hrs.	เก็บพ้นแสง,การเก็บในตู้เย็น อาจทำให้ยาตกตะกอน
Magnesium 10%,50%	IV infusion	NSS,Dextrose solution,lactate d ringer's solution	-	24 hrs.	ยาไม่เข้ากับ Calcium injection, bicarbonate ห้ามแช่ตู้เย็น (ตกตะกอน)
Metoclopramide	IM,IV 1-2 นาที ,IV infusion	D5W,NSS,LRS	IV หลังผสม 24 hr. Ampule เปิดแล้ว ทิ้ง	เก็บให้พ้นแสง	-

ชื่อการค้า/ ชื่อสามัญ	วิธีฉีด	Recommended Solution For IV infusion	ความคงตัว ในตู้เย็นเมื่อผสม /เปิดแล้ว	ความคงตัวที่ R.T. เมื่อผสม/เปิดแล้ว	หมายเหตุ
Metronidazole	IV infusion 90 min or 5 ml/min	Ready to use เปิดแล้วใช้ ภายใน 24 hr	-	-	-
PGS (Penicillin G)	IM,IV infusion	D5W,NSS	7 day	1 day	-การให้ยาในขนาดสูงต้องให้ ช้า ๆ เพราะมีผลต่ออิเล็กโทร ไลต์ -IM(ที่ความเข้มข้น <100000u/ml)
Phenobarbital inj.	SC,IM, slow IV (10-15 นาที)	SWI	-	-	-
Potassium chloride inj.	IV infusion	D5W,NSS, D5N/2, ringer's solution	-	24 hrs.	ในการรักษาภาวะ hypokalemia ไม่ควรผสม KCl กับ glucose solution
Ranitidine	IM,slow Ivafter dilute, Direct IV 50 g/diluent total>20 ml ให้ ช้า ๆ 5 min (4 ml/min)	D5W,NSS,D10 W	4 องศา เก็บได้ 14 วัน	-	ควรเก็บป้องกันแสง ไม่เข้ากับ Amphotericin B,Clindamycin,Diazepam, Pentobarbital,Phenobarbital
Sodium bicarbonate inj.	IV infusion	-	-	-	ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ไม่เข้ากับ สารที่เป็นกรดและ เกลือ alkaline โดยเฉพาะ สารละลาย calcium
Terbutaline inj.	SC,IM, IV infusion, IVbolus	D5W,NSS	-	เมื่อสารละลายไม่มี สี	ควรใช้ infusion pump ในการ ให้ทาง IV infusion
Verapamil inj.	Slow IV (ประมาณ 2 นาที)	-	-	-	ยาไม่เข้ากับสารละลาย ประเภทต่าง (alkaline solution เช่น bicarbonate)

